

የሲናርና የጓያ ድብልቅ የእንስሳት መኖ

መግቢያ

ሲናርና ጓያ ቋሚ ያልሆኑ በአንድ የሰብል ወቅት ተመርተው ለአገልግሎት የሚወሉ የመኖ ዝርያዎች ናቸው። ሲናር ከሳር ጓያ ደግሞ ከጥራጥሬ አዝርት ይመደባሉ። ሲናር ሃይል ሰጭ ሲሆን ጓያ ደግሞ በገንቢ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው።



የንጥረ ነገር ይዘት እና ጠቀሜታ

- የሲናርና ጓያ ቅይጥ በሄክታር እስከ 17 ቶን የሚሆን ደረቅ የመኖ ምርት ማስገኘት ሲችል፣ 15.5% የተጣራ ፕሮቴን ይሰጣል።
- የሲናርና ጓያ ቅይጥ በፕሮቴን እና ሃይል ሰጭ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ በመሆኑ ለእንስሳት የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ይረዳል። ጓያ የአፈርን የናይትሮጅን መጠን ከፍ እንዲል በማድረግ የአፈር ለምነት እንዲጨምርና በተለይም ሰብልን እያፈራረቁ በሚዘፋበት ጊዜ የአረምና የበሽታን መስፋፋትን ለመቀነስ ያስችላል።
- ይህ ድብልቅ በተለይም ለሚታለቡ ላሞች፣ ለስጋ ከብቶች እና በጎች ጠቀሜታ አለው።
- 30% የሲናርና ጓያ ቅይጥን ከ70% አካባቢ ከሚገኝ ሌላ መኖ ጋር ቀላቅሎ መመገብ የእንስሳትን ምርታማነት እንዲጨምርም ይረዳል።
- ለሚታለቡ ላሞች በየቀኑ 2 ኪ.ግ የደረቀ የሲናርና ጓያ ቅይጥ ከሌላ መኖ ጋር ተደባልቆ ቢመገቡ የወተት ምርታቸው በአማካኝ እስከ 50% ይጨምራል።

ምስጋና

አፍሪካ ራይዚንግ (Africa RISING) ፕሮግራሙ በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት (USAID) ገንዘብ የሚደገፍና በተለያዩ አገር አቀፍ እና አለም አቀፍ የምርምር እና የልማት አጋሮች በጋራ የሚተገበር ነው። ለፕሮግራሙ መሳካት አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ በሙሉ የላቀ ምስጋና እናቀርባለን።

የመሬት አዘገጃጀት እና አበቃቀል

- የሲናር እና የጓያ ቅይጥ ዘርን የምንዘራበት መሬት መታረስና መለስለስ አለበት።
- ከመዝራታችን በፊት የተዘጋጀው መሬት ውሃ የማያቁር መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
- ለአንድ ሄክታር 75 ኪ.ግ የሲናር ዘርና 25 ኪ.ግ የጓያ ዘር ቀላቅሎ መዝራት በቂ ነው።
- ሲናርና ጓያ ተቀላቅለው ሲዘፋ ከ60–90 ባሎች ቀናት ውስጥ ለመኖነት ይደርሳሉ። ፈጥነው የሚደርሱ በመሆናቸው ከመስኖ በሚገኝ ውሃ ለማብቀልና በአጭር ጊዜ ለመጠበቅ ይቻላል።
- በአነስተኛ ማሳ ላይም በቀላሉ ዘር ማባዛት ይቻላል።



ለተጨማሪ መረጃ

ክንዱ መኮንን
መልካሙ በዛብህ
አበራ አዲ
ስምረት ያሳቡ
ስልክ : +251 116172000/2234